


SANTÉ ET SOINS DE LA MALADIE DE L'ENFANT


Diarrhée

Recherche de soins pour la diarrhée




Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés selon la source du conseil ou du traitement.

Disparités dans la recherche de soins pour la diarrhée




Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée au cours des deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés dans un établissement de santé ou chez un prestataire suivant diverses caractéristiques

Alimentation pendant la diarrhée




Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu une épisode de diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture donnés durant l'épisode de diarrhée

Recherche de soins pendant la fièvre



Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu de la fièvre dans les deux dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou du traitement


Disparités dans la recherche de soins pendant la fièvre



Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu de la fièvre dans les deux dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché dans un établissement de santé ou chez un prestataire suivant diverses caractéristiques


Symptômes d'Infection Respiratoire aiguë (IRA)

Recherche de soins pour les symptômes d'IRA



Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu des symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché, selon la source du conseil ou du traitement

Disparités dans la recherche de soins pour les symptômes d'IRA



Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu des symptômes d'IRA dans les deux dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché dans un établissement de santé ou chez un prestataire suivant diverses caractéristiques

Données par région sur la recherche de soins pour les maladies de l'enfance

Region	Rechercher des soins dans un établissement de santé ou un prestataire pour:	
	Diarrhée	Fièvre
National	33,1	73,5
District Tunis	(39,4)	75,3
Nord-Est	(41,5)	80,0
Nord-Ouest	(24,3)	71,4
Centre-Est	(26,1)	77,2
Centre-Ouest	30,9	62,1
Sud-Est	(37,4)	67,5
Sud-Ouest	(35,2)	72,7

Messages Clés

- Pour 98 % d'enfants (0-59 mois) présentant des symptômes d'IRA au cours des deux dernières semaines de l'enquête, leur mère ou la personne en charge avait demandé un conseil pour un traitement dans un établissement de santé ou auprès d'un prestataire de soins, tandis que 33 % et 74 % de ceux présentant des symptômes de diarrhée et fièvre respectivement ont demandé ce conseil.
- Pendant l'épisode de la diarrhée 37 % d'enfants de 0 à 59 mois mangent à peu près la même quantité, 28 % mangent un peu moins, 17 % beaucoup moins, et seulement 7 % mangent plus,
- Pendant l'épisode de la diarrhée 35 % d'enfants âgés de 0 à 59 mois boivent à peu près la même quantité de liquide, 32 % boivent plus, 12 % boivent un peu moins et 12 % boivent beaucoup moins.